




Årsrapport 2011

Produktion

Under 2011 utfördes totalt 326 ablationer eller elektrofysiologiska undersökningar. Dessa fördelades enligt figuren nedan. Som framgår av denna utgjordes 66 % av alla ingrepp av förmaksflimmer vilket gör kliniken till en av de största i landet inom flimmerablation.



Väntetid

Den genomsnittliga väntetiden för standardablationer (ej flimmer) har varit två veckor. Motsvarande medelväntetid för flimmerablationer var tre veckor, räknat från den dag då patienten varit medicinskt förberedd för ingreppet, d.v.s. då patienten varit välinställd på Waran i minst tre veckor.

Övrig verksamhet

Antalet mottagningsbesök var under året 59 stycken och antalet polikliniska elkonverteringar 24.

Remitter

Under 2011 remitterades 63% av patienterna från landsting, 35% från försäkringsbolag och 2% utgjordes av privatbetalande patienter. Totalt 10 landsting skickade patienter till oss under 2011 där de största remittenterna utgjordes av Gävleborg, Skåne och Halland.


Resultat

6-månaders uppföljning


Samtliga **färdigbehandlade** patienter på Arrhythmia Center har fått en enkät hemskickad 6 månader efter ablationen. Svarsfrekvensen var **93%**.

Förmaksflimmerablation

Effekten av ablation på livskvalité hos patienter med förmaksflimmer




Effekten av ablation på arytmibesvären efter genomgången flimmerablation




Ablation av övriga arytmier

Effekten av ablation på livskvalité hos patienter med SVT




Effekten av ablation på arytmibesvär efter genomgången ablation




Patientenkät - patientens uppfattning om vården på ACS

Sedan i augusti 2010 tillfrågats alla patienter om hur de uppfattat vården hos oss genom en anonym enkät. Hittills har sammanlagt 338 patienter svarat på enkäten.


Jag blev respektfullt bemött av läkarna



Jag blev respektfullt bemött av övrig personal



Jag anser att verksamheten på ACS bedrivs på ett professionellt sätt



Komplikationer

Under 2011 inträffade två komplikationer på 326 ingrepp (0,6%). Båda dessa utgjordes av tamponader som behandlades framgångsrikt med perikardtappning. Båda patienter kunde skrivas ut från sjukhuset efter ett par dagar och har återhämtat sig helt.

Forskning

Klinikens läkare publicerade under 2011 två vetenskapliga artiklar.