




Årsrapport 2010

Produktion

Under 2010 utfördes totalt 277 ablationer eller elektrofysiologiska undersökningar. Dessa fördelades enligt figuren nedan. Som framgår av denna utgjordes 65% av alla ingrepp av förmaksflimmer vilket gör kliniken till en av de största i landet inom flimmerablation.



Väntetid

Den genomsnittliga väntetiden för standardablationer (ej flimmer) har varit två veckor. Motsvarande väntetid för flimmerablationer var tre veckor, räknat från den dag då patienten varit medicinskt förberedd för ingreppet, dvs då patienten varit välinställd på Waran i minst tre veckor.

Övrig verksamhet

Antalet mottagningsbesök var under året 53 stycken och antalet polikliniska elkonverteringar 13. Cirka 1100 telefon- samt ca 280 mailkonsultationer utfördes.

Remitterter

Under 2010 remitterades 68% av patienterna från landsting, 31% från försäkringsbolag och 1% utgjordes av privatbetalande patienter. Totalt 10 landsting skickade patienter till oss under 2010 där de största remittenterna utgjordes av Gävleborg, Skåne och Halland.

Resultat

Den primära lyckande frekvensen var 99% för ”icke-flimmerablationer” medan motsvarande siffra för flimmerablationer var 97%. Recidivrisken vid flimmerablation är signifikant högre än vid vanliga ablationer och det är därför av stor vikt att utvärdera resultatet av en flimmerablation först efter ca 6 månader. Baserat på de kriterier för


uppföljning som finns inom ramen för det nationella ablationsregistret har samtliga patienter som genomgick ablationer under våren 2010 följts upp via en enkätundersökning, se resultat nedan. Fortsättningsvis kommer de årliga rapporterna från ACS att omfatta höstterminens ablationer från året innan samt de ingrepp som gjordes under våren det aktuella rapporteringsåret.

6-månaders uppföljning


150 ablationer utfördes på 127 patienter mellan januari och juni 2010. Samtliga patienter fick en enkät hemskickad. Svarsfrekvensen var 85%.

Förmaksflimmerablation

Effekten av ablation på livskvalité hos patienter med förmaksflimmer





Effekten av ablation på arytmibesvären efter genomgången flimmerablation



Ovanstående ablationsresultat uppnåddes efter ett ingrepp hos 76% av patienterna medan resterande genomgick två ingrepp.

Ablation av övriga arytmier


Effekten av ablation på livskvalité hos patienter med SVT



Patientenkät - patientens uppfattning om vården på ACS

Sedan i augusti 2010 tillfrågas alla patienter om hur de uppfattat vården hos oss genom en anonym enkät. 115 patienter genomgick ablation under perioden augusti-december 2010.


Jag blev respektfullt



(1 =ej, 2 = till viss del, 3 = ganska väl, 4 = helt och hållet)


bemött av läkarna

Jag blev respektfullt bemött av övrig personal



(1 =ej, 2 = till viss del, 3 = ganska väl, 4 = helt och hållet)

Jag anser att verksamheten på ACS bedrivs på ett professionellt sätt



(1 =ej, 2 = till viss del, 3 = ganska väl, 4 = helt och hållet)

Komplikationer

Under 2010 inträffade tre komplikationer (1%). Samtliga dessa utgjordes av tamponader som behandlades framgångsrikt med perikardtappning. Alla tre patienter kunde skrivas ut från sjukhuset efter ett par dagar och har återhämtat sig helt utan sequelae.

Forskning

Klinikens läkare publicerade under 2010 fyra vetenskapliga artiklar. Klinikens resultat presenterades som abstrakt vid det kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.